대장내시경 안내서(오전, 쿨프렙산 Coolprep)

등록번호 :	이름:	생년월일:	성별:
검 사 명 : 대장내시경 검사(수면) + 위내시경 검사(수면)		＊치아흔들림 (없음 / 있음 / 의치)	
예약일시 : 20 년 월 일 (요일) 오전 시 분		※본관 2층 건강증진센터로 8시30분까지 오십시오.	

〈〈 대장내시경 준비사항 〉〉

〈 전날 〉

1. 점심식사는 가볍게 하시고, 저녁은 물종류만 드십시오.
2. **저녁 8시부터** 쿨프렙산 A제(1포)와 B제(1포)를 500mL 통에 넣은 후,
   물 500mL 표시선까지 채우고 잘 흔들어 15분 간격으로 두번에 나누어 복용하십시오.(500mL)
3. 같은 방법으로 쿨프렙액을 한번 더 복용합니다.(500mL)
4. 약을 다 드시고 1시간내에 추가로 물을 500mL 드십니다.(물 500mL) ➡ **총 1.5리터**

〈 당일 〉

1. **새벽 5시부터** 남은 쿨프렙산 A제(1포)와 B제(1포)를 500mL 통에 넣은 후,
   물 500mL 표시선까지 채우고 잘 흔들어 15분 간격으로 두번에 나누어 복용하십시오.(500mL)
2. 같은 방법으로 쿨프렙액을 한번 더 복용합니다.(500mL)
3. 약을 다 드시고 1시간내에 추가로 물을 500mL 드십니다.(물 500mL) ➡ **총 1.5리터**
   단, 혈압약 드시는 분은 대장준비약 모두 다 드신 후 바로 **혈압약**을 드십시오. **(7시 경)**
4. 약을 드시면 대변을 빈번하게 보게되며, 점차 물과 같은 변을 보게됩니다.
   충분히 대변을 다 보신 후 금식상태로 예약시간에 맞춰 도착하십시오.

〈〈 주 의 사 항 〉〉

〈 검사 전 〉

- **검사 3일전 부터** 씨있는 과일(수박, 참외, 포도 등) 및 검은 쌀, 현미, 김, 미역 등은 소화가 잘 안되어 남아 있을 수 있으므로 드시지 마십시오.

〈 검사 후 〉

1. 검사 중 가스가 대장 내로 주입되므로 검사 후 복부 불편감이 있으나 가스가 배출되면 불편감이 해소됩니다.
2. 검사 후 식사여부는 내시경검사 결과 확인 후 설명드립니다.

＊ 검사 중 정밀검사(조직검사나 용종절제술 등)를 시행하는 경우는 추가비용부담이 있으며, 용종절제술 시행할 경우 용종크기와 갯수에 따라 당일 입원하는 경우도 있습니다.(1박 2일)
정밀검사(헬리코박터균검사, 조직검사, 용종절제술 등) 시행 여부 동의여부 ( )
용종제거 및 용종절제술시 추가비용(15~30여만원)이 발생됩니다.
당일 용종제거가 불가능한 경우 추후 일정조정이 필요하며 비용이 재발생됩니다.

＊ **수면내시경**은 사용하는 약제의 부작용으로 딸꾹질, 구역, 구토, 진정과다, 졸음, 두통, 혈압 및 맥박수의 변동, 운동실조, 어지러움, 지각장애, 복시, 두드러기 등이 나타날 수 있습니다. 아주 드물게 호흡억제, 심정지가 발생하여 사망에 이르는 경우도 있습니다. 그러나 이러한 합병증은 현재까지 거의 발생하지 않고 있으며 적절한 조치로 대처할 수 있습니다. 이러한 문제점에 대처하기 위하여 보호자의 동반이 꼭 필요하며 당일 자가운전을 금합니다.

수면 내시경 동의 여부 수면 ( ) 비수면 ( )

＊ **아래 약물을 복용 할 경우 표시해 주십시오. 예 ( ) 아니오 ( )**
용종절제술시 출혈예방을 위해 1주일정도 복용중단이 필요하므로 사전에 문의 바랍니다.
: 아스피린계(아스피린, 아스트릭스), 와파린(코우마딘), 클로피도그렐(프라빅스)

20 년 월 일 / 환자 또는 보호자 _____ (인, 서명)

경희의료원 건강증진센터 02-958-8711~3